

## Uro-Vaxom®

OM Pharma SA

### **Che cos'è Uro-Vaxom e quando si usa?**

Uro-Vaxom è un medicamento di origine biologica usato come stimolante del sistema immunitario per aumentare le difese naturali. Uro-Vaxom può prevenire le infezioni ricorrenti del sistema urinario, in particolare la cistite. Può anche essere usato in combinazione con altri trattamenti prescritti durante le fasi acute delle infezioni delle vie urinarie.

Su prescrizione medica.

### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto contemporaneamente antibiotici o disinfettanti per le vie urinarie, non dimentichi di prenderli.

### **Quando non si può assumere Uro-Vaxom?**

Se è allergico ai lisati batterici liofilizzati di *Escherichia coli* o ad uno qualsiasi degli ingredienti di questo medicamento (elencati nella rubrica «Cosa contiene Uro-Vaxom? »

### **Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Uro-Vaxom?**

In caso di reazione cutanea, febbre o gonfiore localizzato (edema), interrompa il trattamento e informi il medico, poiché potrebbe trattarsi di reazioni allergiche.

Informi il medico se sta assumendo agenti immunosoppressori. Questi medicamenti vengono utilizzati per ridurre le risposte immunitarie dell'organismo (ad esempio, a seguito di un trapianto di organi) e possono ridurre o bloccare l'effetto del trattamento con Uro-Vaxom.

La somministrazione di Uro-Vaxom a bambini di età pari o inferiore a 4 anni non è raccomandata.

Ad oggi non ci sono dati che indichino che l'assunzione di Uro-Vaxom possa compromettere la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare macchine.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula, cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti (anche se acquistati di sua iniziativa).

### **Si può assumere Uro-Vaxom durante la gravidanza o l'allattamento?**

Se è incinta o desidera rimanere incinta, informi il suo medico.

#### *Gravidanza*

È preferibile evitare l'uso di Uro-Vaxom durante la gravidanza (in particolare durante il primo trimestre).

#### *Allattamento*

Uro-Vaxom deve essere usato durante l'allattamento solo dopo aver consultato il medico.

### **Come usare Uro-Vaxom?**

#### *Trattamento preventivo e/o di consolidamento*

1 capsula al giorno, da assumere preferibilmente al mattino a digiuno, per 3 mesi consecutivi.

*Trattamento degli episodi acuti:* 1 capsula al giorno, da assumere preferibilmente al mattino a digiuno, fino alla scomparsa dei sintomi, ma almeno per 10 giorni consecutivi.

L'uso e la sicurezza di Uro-Vaxom nei bambini sotto i 4 anni finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### **Quali effetti collaterali può avere Uro-Vaxom?**

Uro-Vaxom può provocare effetti indesiderati:

#### *Comune (può riguardare fino a 1 utilizzatore su 10)*

Diarrea, nausea, mal di testa, problemi digestivi, intolleranza gastrica

#### *Non comune (può riguardare fino a 1 utilizzatore su 100)*

Reazioni allergiche, dolore addominale, eruzione cutanea, prurito, febbre

#### *Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10'000)*

Gonfiore (edema) della bocca, gonfiore di caviglie, piedi o dita, perdita di capelli

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

#### *Indicazione di stoccaggio*

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) nella confezione originale. Uro-Vaxom deve essere conservato in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

### **Cosa contiene Uro-Vaxom?**

#### *Principi attivi*

6 mg di lisati batterici liofilizzati di *Escherichia coli*.

#### *Sostanze ausiliarie*

Amido (pregelatinizzato), magnesio stearato, gallato di propile (E310), glutammato di sodio, mannitolo.

Composizione del rivestimento della capsula: gelatina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), biossido di titanio (E171).

Ogni capsula contiene 2,85 mg di sodio.

### **Numero dell'omologazione**

00598 (Swissmedic).

***Dove è ottenibile Uro-Vaxom? Quali confezioni sono disponibili?***

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 30 e 90 *capsule*.

***Titolare dell'omologazione***

OM Pharma SA, Rue du Bois du Lan 22, 1217 Meyrin/Svizzera.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

17040 / 12.06.2020